

抗体検査の受検・予防接種歴の調査について

大阪大学医学部保健学科への合格、おめでとうございます。

医療職者を養成する本学科では、病院など医療施設における実習が必須です。その際に、いくつかの予防可能な感染症については、1)自分自身を守るため、2)接触した患者さんなどに感染を広げないために、抗体検査の受検とワクチン接種の指導を行っています。

入学前、入学後の対応について、以下をご準備いただきますようお願いいたします。これらは実習に必須のもので、よろしく願いいたします。

【入学前に行うこと】

- ① **麻疹・風疹・ムンプス(流行性耳下腺炎)・水痘の抗体検査**を近隣の病院で受検してください。
- ② **抗体検査の結果、抗体価が陰性または擬陽性であった場合は、追加接種を行ってください。**
抗体価が陰性であった場合は **2回**、擬陽性であった場合は **1回**の追加接種が必要です。追加接種は入学後でも間に合いますが、**できれば入学前に近医等で接種しておくことを推奨**します。抗体価の判断は、次ページの表を参考にしてください。

【入学後に行うこと】 ※詳細は、入学後に案内します。

- ① 以下を報告・提出してください。【提出締切 2024/4/15(月)】
 - ・**入学前の麻疹・風疹・ムンプス(流行性耳下腺炎)・水痘の抗体検査の結果**
[検査結果を撮影またはスキャンしたものを提出]
 - ・**その後のワクチンの追加接種記録**
[接種記録(年月日)が分かるもの(領収書等)を撮影またはスキャンしたものを提出]
 - ・**麻疹・風疹・ムンプス(流行性耳下腺炎)・水痘の予防接種歴**
[1歳以降に接種した2回の予防接種歴(年月日)の記録が分かるもの(母子健康手帳等)の該当ページを撮影またはスキャンしたものを提出]
- ② 入学前の麻疹・風疹・ムンプス(流行性耳下腺炎)・水痘の抗体検査の結果、必要とされるワクチンの追加接種を受けていない場合は、1年次に必ず受けてください。
- ③ 1年次にB型肝炎のワクチン接種3回と抗体検査を受けていただきます。

ご不明な点がございましたら、保健学科教務係(E-mail: vaccine@sahs.med.osaka-u.ac.jp)にご連絡ください。

[参考]抗体価の判断基準

	陰性	擬陽性	陽性
	あと2回の予防接種が必要	あと1回の予防接種が必要	今すぐの予防接種は不要
麻疹	EIA法 (IgG) 2.0未満 PA法 1:16未満 中和法 1:4未満	EIA法 (IgG) 2.0以上 16.0未満 PA法 1:16、1:32、1:64、1:128 中和法 1:4	EIA法 (IgG) 16.0以上 PA法 1:256以上 中和法 1:8以上
風疹	HI法 1:8未満 EIA法 (IgG) (A) 2.0未満 EIA法 (IgG) (B) ΔA0.100未満 ※:陰性 ELFA法 (C) 10IU/mL未満 LTI法 (D) 6IU/mL未満 CLEIA法 (E) 10IU/mL未満 CLEIA法 (F) 抗体価4未満 FIA法 (G) 抗体価1.0AI未満 FIA法 (H) 10IU/mL未満 CLIA法 (I) 10IU/mL未満 LTI法 (J) 6IU/mL未満	HI法 1:8、1:16 EIA法 (IgG) (A) 2.0以上 8.0未満 EIA法 (IgG) (B) 30IU/mL未満 ELFA法 (C) 10以上 45IU/mL未満 LTI法 (D) 6以上 30IU/mL未満 CLEIA法 (E) 10以上 45IU/mL未満 CLEIA法 (F) 抗体価4以上 14未満 FIA法 (G) 抗体価1.0以上 3.0AI未満 FIA法 (H) 10以上 30IU/mL未満 CLIA法 (I) 10以上 25IU/mL未満 LTI法 (J) 6以上 35IU/mL未満	HI法 1:32以上 EIA法 (IgG) (A) 8.0以上 EIA法 (IgG) (B) 30IU/mL以上 ELFA法 (C) 45IU/mL以上 LTI法 (D) 30IU/mL以上 CLEIA法 (E) 45IU/mL以上 CLEIA法 (F) 抗体価14以上 FIA法 (G) 抗体価3.0AI以上 FIA法 (H) 30IU/mL以上 CLIA法 (I) 25IU/mL以上 LTI法 (J) 35IU/mL以上
水痘	EIA法 (IgG) 2.0未満 IAHA法 1:2未満 中和法 1:2未満	EIA法 (IgG) 2.0以上 4.0未満 IAHA法 1:2 中和法 1:2	EIA法 (IgG) 4.0以上 IAHA法 1:4以上 中和法 1:4以上
おたふくかぜ	EIA法 (IgG) 2.0未満	EIA法 (IgG) 2.0以上 4.0未満	EIA法 (IgG) 4.0以上

「医療関係者のためのワクチンガイドライン 第3版」より抜粋

[参考]費用の目安(※検査・接種料金は医療機関によって異なります)

https://healthcare-sccre.org/?page_id=1533

以上